



Un débourrement dans la « normale »

Après l'hiver le plus chaud jamais observé depuis 1900 (décembre-janvier-février), le mois de mars se révèle globalement plus froid, mais avec des périodes contrastées.

Au cours des deux premières décades, les températures sont inférieures aux normales puis, à partir du 25, une relative douceur s'installe jusqu'en fin de mois. Le mois d'avril débute dans la fraîcheur mais les températures remontent rapidement au-dessus des normales de saison, provoquant la reprise d'activité de la vigne.

Malgré un épisode plus frais entre le 7 et le 9 avril, le débourrement s'enclenche ensuite à la faveur de la remontée des températures.

Le stade mi- débourrement est observé autour de la mi-avril, proche des dates de 2015 et de la moyenne décennale.


Stade mi-débourrement

(50 % de bourgeons au stade pointes vertes)

	2015	2016	Moyenne décennale
Yonne Chardonnay	15/4	14/4	14/4
Yonne Pinot Noir	15/4	15/4	16/4
Côte de Beaune Chardonnay	12/4	12/4	11/4
Côte de Beaune Pinot Noir	10/4	12/4	13/4
Côte Chalonnaise Chardonnay	15/4	14/4	14/4
Côte Chalonnaise Pinot Noir	15/4	15/4	14/4
Mâconnais Chardonnay	13/4	12/4	11/4

Source : réseau de parcelles de référence du BIVB

Températures moyennes et précipitations – période du 15/3 au 20/4/16



Sources : Météo France et 