



Un débourrement très précoce !

Après un mois de janvier froid et sec, les températures passent au-delà des normales dès les premiers jours de février et se maintiennent à ce niveau. Si le mois de janvier est déficitaire, en moyenne de 60 % en termes de précipitations, la situation est plus contrastée en février affichant environ – 20 % sauf sur Beaune et Rully qui enregistrent des excédents respectifs de 12 et 29 %. Quant au mois de mars, les cumuls de précipitations sont excédentaires en moyenne de 50 %, avec toutefois une grande variabilité selon les zones viticoles.

Le fait le plus marquant de ce début d'année concerne les températures moyennes mensuelles, qui sont supérieures de 2,5 °C par rapport aux normales en février et de 2,4 °C en mars. L'envolée des températures durant la dernière décade de mars provoque une reprise rapide du cycle végétatif avec débourrement précoce et d'une très courte durée.


Les dates de mi- débourrement sont voisines de celles observées en 2011.

Dates estimées du stade mi- débourrement 2017 (50 % de bourgeons au stade pointes vertes)

	2011	2017	Moyenne (1994-2016)
Yonne Chardonnay	5/4	5/4	12/4
Yonne Pinot Noir	7/4	8/4	15/4
Côte de Beaune Pinot Noir	5/4	5/4	12/4
Côte de Beaune Chardonnay	4/4	2/4	9/4
Côte chalonaise Chardonnay	6/4	5/4	13/4
Côte chalonaise Pinot Noir	6/4	5/4	14/4
Mâconnais Chardonnay	5/4	3/4	8/4
Mâconnais Gamay	7/4	7/4	9/4

Source : réseau de parcelles de référence du BIVB

Températures moyennes (°C) et précipitations (mm) – Période du 01/01/2017 au 01/04/2017



Sources : Météo France et 