



Une floraison tardive mais rapide

Après un mois de mai relativement maussade et frais, la première décade de juin se situe dans la normale grâce à une période fraîche suivie d'une période plus chaude. La seconde décade présente de températures inférieures aux normales de saison et il faut attendre le 21 juin pour voir les températures s'envoler ! Si les toutes premières fleurs sont observées vers la mi-juin en situations précoces, la floraison ne s'enclenche réellement qu'à la fin de la deuxième décade. Le maintien de températures supérieures à la normale favorise une floraison rapide, en quelques jours seulement. 2016 reste néanmoins parmi les millésimes les plus tardifs avec des dates de mi-floraison assez proches de celles observées en 1995.

Dates moyennes estimées du stade mi-floraison (50 % de fleurs ouvertes)

	1995	2016	Moyenne (1994-2015)
Yonne Chardonnay	25/6	25/6	14/6
Yonne Pinot Noir	25/6	26/6	14/6
Côte de Nuits Pinot Noir	20/6	21/6	9/6
Côte de Beaune Pinot Noir	21/6	22/6	8/6
Côte de Beaune Chardonnay	21/6	22/6	7/6
Côte Chalonnaise Pinot Noir	21/6	21/6	9/6
Côte Chalonnaise Chardonnay	21/6	22/6	9/6
Mâconnais Chardonnay	20/6	20/6	8/6
Mâconnais Gamay	21/6	20/6	8/6

Source : Réseau de parcelles de référence du BIVB

Températures moyennes journalières (°C) mois de juin 2016

