



## Une floraison (encore) précoce

Si les tous premiers jours de mai sont frais, les températures moyennes remontent rapidement et dépassent les normales saisonnières. Un refroidissement survient au début de la deuxième décennie mais les températures repartent à la hausse et se maintiennent au-dessus de la normale.

Les toutes premières fleurs sont observées un peu après la mi-mai en secteurs précoces. Les stades mi-floraison estimés placent 2018 parmi les années les plus précoces, en troisième position après 2007 et 2011.


Les dates estimées du stade mi- débourrement sont comprises entre celles observées en 2015 et 2010.

### Dates estimées du stade mi- floraison (50 % de fleurs ouvertes)

	<b>2007</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>Moyenne (1994-2017)</b>
Yonne Chardonnay	27/5	24/5	2/6	<b>13-juin</b>
Yonne Pinot	27/5	26/5	3/6	<b>14-juin</b>
Côte de Nuits Pinot	24/5	21/5	31/5	<b>9-juin</b>
Côte de Beaune Pinot	22/5	21/5	29/5	<b>8-juin</b>
Côte de Beaune Chardonnay	19/5	20/5	30/5	<b>6-juin</b>
Côte chalonaise Pinot	23/5	21/5	1/6	<b>8-juin</b>
Côte chalonaise Chardonnay	23/5	23/5	1/6	<b>9-juin</b>
Mâconnais Gamay	24/5	23/5	1/6	<b>8-juin</b>
Mâconnais Chardonnay	23/5	22/5	2/6	<b>8-juin</b>

*Source : réseau de parcelles de référence du BIVB*

Evolution des températures moyennes et des précipitations – 01/05/2018 au 03/06/2018



Source :  et Météo France