

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

METEO

Encore et toujours de la pluie ! Si cette semaine a été un peu moins arrosée sur certains secteurs, avec par moment un temps enfin estival, des orages ont encore éclaté sur le territoire, générant des cumuls une nouvelle fois très hétérogènes sur l'ensemble de la région.

Pluies du 25 juin au 01 juillet

Département	Min (mm)	Max (mm)
Saône et Loire	3	35
Côte d'Or	6	62
Yonne	15	65
Nièvre	13	56
Franche-Comté	14	38

Prévisions du 02 juillet au 08 juillet

La semaine à venir ne s'annonce pas encore sous un grand soleil. En effet, si les cumuls ne devraient pas être trop importants, les prévisions sont malgré tout orientées sur un temps couvert, avec des risques de précipitations, notamment pour la fin de semaine.

MARDI 02	MERCREDI 03	JEUDI 04	VENDREDI 05	SAMEDI 06	DIMANCHE 07
					
14° / 22°	15° / 22°	15° / 25°	11° / 26°	15° / 27°	16° / 26°
▲ 15 km/h	▲ 10 km/h	▼ 15 km/h	▼ 5 km/h	▲ 10 km/h	► 10 km/h

(Source MétéoFrance, ville Chalon sur Saône, <https://météofrance.com>)

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

STADES VEGETATIFS

La phénologie est aussi hétérogène et perturbée que la météo. En effet, si les baies se sont bien développées sur certains secteurs avec des parcelles proches de la fermeture, on observe encore des parcelles à la nouaison, avec une forte variabilité, y compris à l'échelle des ceps. En parallèle, ce temps humide et maintenant plus chaud est très favorable à la pousse, avec une production d'entre-cœurs et de nouvelles feuilles importante. A ce jour l'année 2024 présente environ une semaine de retard par rapport à 2023, elle est comparable à 2021 ou encore à 2019.

Vignoble	Stades Mini	Stades Maxi
Saône-et-Loire	Début nouaison	Pré-fermeture
Côte d'Or	Début nouaison	Pré-fermeture
Yonne	Début nouaison	Grains de pois
Nièvre	Nouaison	Grains de plomb
Franche-Comté	Fin floraison	Grains de pois

ACCIDENT CLIMATIQUE

Des orages de grêle ont provoqué localement (sur le Chablisien, le Beaujolais, le Jura et la Côte de Nuits) quelques dégâts, qui semblent malgré tout assez limités.

MILDIU

Situation :

245 observations ont été réalisées sur le réseau BSV.


Une évolution significative est encore constatée cette semaine, avec la présence de symptômes sur feuilles détectée sur 244 des 245 parcelles observées ! Cependant, l'intensité des symptômes est assez

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

variable d'une parcelle à l'autre, en fonction de différents facteurs (protection en place, sensibilité des parcelles, historique des symptômes, vigueur végétative, gestion de l'herbe...).

Le graphique ci-dessous montre l'évolution sur la semaine écoulée, avec un « glissement » vers les classes supérieures, et notamment près de 30% des parcelles à plus de 75% de ceps touchés.

MILDIOU - évolution entre le 24 juin et le 1 juillet
Fréquence de ceps touchés sur le réseau BSV



On note également une évolution significative sur grappes, avec de nouvelles parcelles concernées, qui étaient encore saines jusqu'à présent, ainsi qu'une progression dans les parcelles déjà touchées. A ce jour, environ 3 parcelles sur 4 (contre 56 % la semaine dernière) présentent des symptômes sur grappes. En plus du Rot gris présent depuis plusieurs semaines, des symptômes de Rot brun commencent à s'extérioriser ponctuellement.

La fréquence de grappes atteintes au sein des parcelles progresse également, avec 28% des parcelles observées présentant plus de 10% de grappes touchées, contre seulement 10% la semaine dernière.

De nouveaux cycles de contaminations sont encore en cours suite aux averses localisées de la semaine dernière. Les symptômes devraient s'extérioriser sur les prochains jours et jusqu'en début de semaine prochaine.

En présence de symptômes de plus en plus fréquents, et généralisés sur le vignoble, le niveau de risque est plus que jamais qualifié de **fort** à **très fort**, notamment sur les parcelles fortement touchées depuis plusieurs semaines. Une vigilance accrue doit être observée sur ces dernières.



Méthodes alternatives : Les méthodes alternatives sont consultables sur le site EcophytoPic (<https://ecophytopic.fr/leviers/prevenir/pratiquer-les-travaux-en-vert>)

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté



Des produits de biocontrôle peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte. La liste des biocontrôles est disponible [ici](#).


OÏDIUM

Situation :

223 observations sur feuilles ont été réalisées sur le réseau BSV.

L'Oïdium progresse peu sur feuilles sur la semaine écoulée. Le nombre de parcelles touchées est quasiment stable avec à peine plus de 25 % sur l'ensemble du réseau. (cf. graphique ci-contre)

Les vignobles de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire et du Jura sont toujours les plus concernés, essentiellement sur les parcelles à forts historiques de Chardonnay.




Les symptômes sur grappes évoluent également, avec à ce jour 14% des parcelles concernées, mais restent discret la plupart avec moins de 10% de grappes touchées dans 9 cas sur 10.

La vigne est toujours dans sa période de forte sensibilité, et ce jusqu'à la fermeture complète de la grappe.

Bien que les conditions climatiques soient toujours perturbées, l'humidité ambiante et les températures plus élevées sont favorables au développement de l'Oïdium. Là où les précipitations ont été limitées au cours de la semaine écoulée, le modèle SOV détecte une activité plus importante du champignon que dans les secteurs bien arrosés.

Le risque peut être qualifié de **modéré à fort** à l'échelle de la **région**, en fonction de la sensibilité et de l'historique parcellaire.



Méthodes alternatives : Les méthodes alternatives (**ébourgeonnage/effeuillage**) sont consultables sur le site EcophytoPic (<https://ecophytopic.fr/leviers/prevenir/pratiquer-les-travaux-en-vert>)



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

Des produits de biocontrôle peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte. La liste des biocontrôles est disponible [ici](#).

BLACK ROT

Situation :


202 observations sur feuilles ont été réalisées sur le réseau BSV.

La situation est assez stable sur feuilles, avec toujours 2/3 des parcelles sans symptôme observé.

Les premiers symptômes sur grappes ont été notés depuis la fin de semaine dernière sur les parcelles fortement touchées sur feuilles, du Nord Beaujolais et du Sud Mâconnais.

De nouveaux symptômes pourraient s'exprimer sur les jours à venir.

Le risque peut être considéré de **faible à modéré** selon la présence de taches sur feuilles, et l'historique des situations. Sur le sud Saône-et-Loire (Mâconnais et Beaujolais), le risque peut en revanche être considéré **modéré à fort** selon les symptômes déjà présents.



Analyse de risque : Rappelons que la période de grande sensibilité des grappes au Black Rot se situe des stades nouaison à début véraison.

VERS DE GRAPPE

Situation : Les captures de tordeuses restent faibles dans l'ensemble du réseau de piégeage, avec quelques prises isolées de Cochylis et d'Eudémis.

Les piégeages se poursuivront sur les semaines à venir.

FLAVESCENCE DORÉE

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL

de Bourgogne-Franche-Comté

Situation : Le message réglementaire concernant les modalités de mise en œuvre des traitements insecticides en Périmètre de Lutte Obligatoire sur la région est disponible, pour des applications à partir du 13/06. Pour en savoir plus : [consulter ce message réglementaire](#).

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

Prochain BSV : mardi 09 juillet

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté (CRA BFC) et rédigé par le représentant de la CRA BFC au sein de la Chambre d'agriculture de Saône et Loire en collaboration avec les membres de la cellule d'analyse de risque : FREDON Bourgogne-Franche-Comté, IFV, et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : **Chambres départementales d'Agriculture de Côte d'Or, Saône et Loire et Yonne, Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles, 110 Vigne, Bourgogne du Sud, Bourgogne Viti Service, Coopérative Agricole Bresse Mâconnais, Coopérative Agricole Mâconnais Beaujolais, Ecovigne, Groupement Vignerons des Terres Secrètes, La Chablisienne, Aces Roses, Domaine Laroche, SICAVAC, Cave de Lugny, Cave des Hautes Côtes, Château de Santenay, Ax'Vigne, Vitagri, Bio Bourgogne, Vignerons de Buxy, Terre Comtoise, Interval, Société de Viticulture du Jura**

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA BFC dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de surveillance Biologiques du territoire du plan Ecophyto II+.

Action du plan Ecophyto II+ piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'office français de la biodiversité.

*Avec la participation
financière de*